



子どもの定期の予防接種



対象年齢の解釈 「～歳に至るまで」「～歳未満」 = お誕生日の前日まで

種類	対象年齢	接種開始年齢	接種回数	接種間隔
小児用肺炎球菌	生後2か月～5歳に至るまで	標準的な接種年齢	4回	【初回接種】標準的には1歳に至るまでに、27日以上の間隔を置いて3回接種 【追加接種】初回接種終了後、60日以上の間隔を置いて、1歳に至った日以降に1回接種(標準的な接種期間は、1歳～1歳2か月)
			3回	【初回接種】標準的には1歳に至るまでに、27日以上の間隔を置いて2回接種 【追加接種】初回接種終了後、60日以上の間隔を置いて、1歳に至った日以降に1回接種
		2回	1歳に至った日の翌日～2歳に至るまで	60日以上の間隔を置いて接種
		1回	2歳に至った日の翌日～5歳に至るまで	5歳に至るまでに接種
種類	対象年齢	標準的な接種年齢(おすすめの接種年齢)	接種回数	接種間隔
B型肝炎	1歳に至るまで	生後2か月～9か月に至るまで	3回	1回目接種後、27日以上の間隔を置いてから2回目接種。1回目接種から139日以上の間隔を置いてから3回目接種。
BCG	1歳に至るまで	生後5か月～8か月に至るまで	1回	
5種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ・ヒブ)	生後2か月～7歳6か月に至るまで	標準的な接種年齢	3回	【1期初回】生後2か月～生後7か月に至るまで 【1期追加】1期初回終了後、6か月～18か月の間隔を置いて
			1回	1期初回終了後6か月以上、標準的には1年から1年6か月の間隔を置いて接種
2種混合(ジフテリア・破傷風)	11歳～13歳未満	【2期】11歳～12歳に至るまで	1回	
MR(麻しん・風しん)	1歳～2歳に至るまで	標準的な接種年齢	1回	【1期】1歳になったらすぐに
			1回	【2期】5歳～7歳未満で小学校就学前の1年間(年長組)
水痘(水ぼうそう)	1歳～3歳に至るまで	【初回接種年齢】1歳～1歳3か月に至るまで	2回	3か月以上の間隔をあけて2回接種(標準的には1歳～1歳2か月の間に初回を接種、6～12か月の間隔を置いて2回目を接種)
日本脳炎	生後6月～7歳6か月に至るまで	標準的な接種年齢	2回	【1期初回】3歳～4歳に至るまで
			1回	【1期追加】4歳～5歳に至るまで
ロタ	出生6週から24週に至るまで	標準的な接種年齢	2回	生後2か月～24週に至るまで ※初回接種は生後2か月から出生14週6日まで
			3回	生後2か月～32週に至るまで ※初回接種は生後2か月から出生14週6日まで
種類	対象年齢	標準的な接種年齢(おすすめの接種年齢)	接種回数	注意事項・その他
HPV(ヒトパピローマウイルス)	小学校6年生相当～高校1年生相当の年齢の女子(R8.4.1時点)	中学校1年生相当の年齢(R8.4.1時点)	2回	1回目の接種を15歳になる前に受ける場合(1回目と2回目の接種は、少なくとも5か月以上あけます。5か月未満である場合、3回目の接種が必要になります。)
			3回	1回目の接種を15歳になってから受ける場合(2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の2か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上、3回目は2回目から3か月以上あけます。)

全年齢 0歳～成人

ワクチン定期接種スケジュール



令和8年4月版

種類	接種回数	接種時期
肺炎球菌(結合型)(PCV15・20)	4回	0歳 ① 1歳 ② 2歳 ③ 27日以上 ④ 60日以上
B型肝炎	3回	0歳 ① 1歳 ② 1歳から139日(20週 約5か月)以上 ③ 27日以上
BCG	1回	0歳 ① 生後5か月～8か月
5種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ・ヒブ)	4回	0歳 ① 20日以上 ② 20日以上(標準的には6か月～18か月未満) ③ 6か月以上 ④ 20日以上(20～56日)～(20～56日)(標準的には6か月～18か月未満)
2種混合(ジフテリア・破傷風)	1回	11歳～13歳未満
麻しん・風しん(MR)	2回	1歳 ① 1歳になったらすぐに ② 5歳～7歳未満で小学校就学前の1年間(年長組)
水痘(水ぼうそう)	2回	1歳～3歳 ① 1歳～1歳3か月 ② 3か月以上(標準的には6か月～12か月未満)
日本脳炎	4回	0歳 ① 生後6月～7歳6か月 ② 3歳～4歳 ③ 4歳～5歳 ④ 6か月以上(6～28日)(標準的には6か月以上)
ロタウイルス	5価:3回	0歳 ① 出生6週から24週 ② 出生6週から32週 ③ 27日以上 ④ 27日以上
HPV(ヒトパピローマウイルス)	9価:2回もしくは3回 15歳以上3回	9～15歳未満 ① 9歳～10歳 ② 11歳～12歳 ③ 13歳～14歳

接種スケジュールは最新情報をご確認ください

5種混合は、2024年4月以降に接種開始の小児に使用

2種混合 ① 11歳での接種が推奨

4回目の接種を忘れないで

接種時期

RSワクチンは、妊娠28週から36週(37週)に至るまで(1)に使用



子どもの予防接種についてはこちらを確認ください